

COVID-19:

Stratificazione del rischio prima dell'endoscopia

(Repici et al., *Gastrointestinal Endoscopy* 2020,

doi: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.03.019>)

- Contatto telefonico con pazienti ambulatoriali un giorno prima dell'endoscopia pianificata
- Contattare il dipartimento / ospedale di riferimento

Domande:

- sintomi? (Febbre > 37,5 ° C, mal di gola, tosse, problemi respiratori)
- Contatto con persone con sospetto o evidenza di infezione da CoV2?
- Ritorno dalle aree a rischio?
- Nessun accesso per accompagnatori (eccezioni: supporto specifico o traduzione richiesta).

Classificazione dei pazienti nei gruppi a rischio prima dell'endoscopia

A basso rischio	<ul style="list-style-type: none">• nessun sintomo (tosse, febbre, respiro corto, diarrea)• nessun contatto con persone positive al SARS-CoV-2• Ritorno dalle aree a rischio
A rischio intermedio	<ul style="list-style-type: none">• Sintomi, ma nessun contatto con persone positive a SARS-CoV-2 e nessun ritorno dalle aree a rischio• Nessun sintomo, ma contatto con persone positive a SARS-CoV-2 o di ritorno dalle aree a rischio
Ad alto rischio	<ul style="list-style-type: none">• tutte le endoscopie di emergenza senza adeguata anamnesi• almeno un sintomo e uno dei seguenti criteri:<ul style="list-style-type: none">- Contatto con una persona positiva a SARS-CoV-2- Rientro da un'area a rischio

Classificazione e protezione del personale

A basso rischio	A rischio intermedio	Ad alto rischio
<ul style="list-style-type: none">• Maschera chirurgica• Copricapo• Occhiali di sicurezza• Grembiule monouso• guanti	Endoscopia apparato superiore: alto rischio	<ul style="list-style-type: none">• Maschera FFP2 o FFP3• Copricapo• Occhiali di sicurezza o scudo• grembiule monouso a maniche lunghe, resistente all'acqua• 2 paia di guanti
	Endoscopia apparato inferiore: basso rischio	