

COVID-19: Stratyfikacja ryzyka w endoskopii przewodu pokarmowego

(z Repici et al., *Gastrointestinal Endoscopy* 2020,
doi: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.03.019>)

- Skontaktuj się telefonicznie/zdalnie z pacjentami 1 dzień przed wyznaczonym terminem badania endoskopowego lub przyjęciem do szpitala
- Skontaktuj się z kierującymi lekarzami/szpitalami

Pytania, które należy zadać:

- Objawy? (gorączka > 37,5 °C, ból gardła, suchy kaszel, problemy z oddychaniem)
- Kontakt z osobami z podejrzeniem/potwierdzeniem infekcji CoV-2?
- Powrót z regionów wysokiego ryzyka? patrz aktualna sytuacja
- Brak wstępu dla osób towarzyszących (wyjątek: potrzeba tłumacza lub formalnego opiekuna)

Niskie Ryzyko	<ul style="list-style-type: none">• Brak objawów (np. kaszel, gorączka, duszność, biegunka)• Brak kontaktu z osobą SARS-CoV-2 dodatnią• Brak pobytu w regionach wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach
Pośrednie Ryzyko	<ul style="list-style-type: none">• Obecne objawy oraz:<ul style="list-style-type: none">– Brak kontaktu z osobą SARS-CoV-2 dodatnią– Brak pobytu w regionach wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach• Brak objawów ale:<ul style="list-style-type: none">– Kontakt z osobą SARS-CoV-2 dodatnią– Pobyt w regionach wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach
Wysokie Ryzyko	<ul style="list-style-type: none">• Wszystkie ostrodyżurowe endoskopia bez pełnego wywiadu• Co najmniej 1 objaw + 1 z poniższych:<ul style="list-style-type: none">– Kontakt z osobą SARS-CoV-2 dodatnią– Pobyt w regionach wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach

Klasyfikacja ryzyka i ubiór ochronny dla personelu

Niskie Ryzyko	Pośrednie Ryzyko	Wysokie Ryzyko
<ul style="list-style-type: none">• Maski chirurgiczne• Czepek• Gogle• Ubiór jednorazowy• Rękawiczki jednorazowe	Gastroskopia/ECPW/EUS: Wysokie ryzyko	<ul style="list-style-type: none">• Maski FFP2 lub FFP3• Czepek• Gogle lub maska twarzowa• Ubiór jednorazowy, długi rękaw, wodoodporny• 2 pary rękawiczek
	Kolonoskopia: Niskie ryzyko	