

COVID-19: Estratificación de riesgos en endoscopia gastrointestinal

(Extraído de Repici et al., *Gastrointestinal Endoscopy* 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.03.019>)

- **Contacte por teléfono u otros medios con sus pacientes, ya sean ambulatorios o estén hospitalizados, un día antes de la endoscopia o admisión programadas.**
- **Contacte con el departamento o hospital de referencia.**

Preguntas a realizar:

- Síntomas? (fiebre > 37.5 °C, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios)
- Contactos con personas sospechosas de positivo en infección por CoV-2?
- Regreso de area de riesgo? Vea a continuación.
- **Acceso prohibido para personas acompañantes (a excepción de personas de soporte específico o intérpretes).**

Clasificación del paciente en grupo de riesgo antes de la endoscopia

Riesgo Bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Sin síntomas (tos, fiebre, problemas para respirar, diarrea) • Sin contacto con personas positivas de SARS-CoV-2 • Sin estancia en áreas de alto riesgo durante los 14 días previos.
Riesgo Intermedio	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de síntomas pero: <ul style="list-style-type: none"> – Sin historia de contacto con personas positivas en SARS-CoV-2. – Sin estancia en áreas de alto riesgo durante los 14 días previos. • Sin síntomas pero: <ul style="list-style-type: none"> – Con contacto con alguna persona positiva en SARS-CoV-2. – Con estancia en una area de riesgo durante los 14 días previos.
Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las endoscopias de emergencia sin historia del paciente. • Como mínimo un síntoma + uno de los siguientes hechos: <ul style="list-style-type: none"> – Contacto con alguien positivo en SARS-CoV-2 – Estancia en una area de alto riesgo durante los 14 días previos.

Equipo de protección del personal según la clase de riesgo

Riesgo Bajo	Riesgo Intermedio	Riesgo Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Máscara quirúrgica • Redecilla para el pelo • Gafas de protección • Bata de un solo uso • Guantes 	Endoscopia del tracto superior: Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Máscaras FFP2 o FFP3 • Redecilla para el pelo • Gafas de protección o careta • Bata de manga larga resistente al agua. • 2 pares de guantes.
	Endoscopia del tracto inferior: Riesgo Bajo.	